



INFORME BUENAVISTA GOLF JUNIO 2010

Tras la visita efectuada el pasado 3 de Junio de 2010 a las instalaciones de Buenavista Golf (Tenerife), con motivo del seguimiento de la preparación del campo para la disputa del Tenerife Ladies Open, llegamos a las siguientes conclusiones:

1. Análisis de la situación actual.

Desde el primer momento, como se puede observar en los anteriores informes, no se ha hecho caso a nuestras indicaciones. Las acciones a llevar a cabo estaban claras y bien definidas desde la primera visita, pero por un motivo u otro se ha intentado poner parches desde un principio, en lugar de atajar el problema de raíz. Hemos oído miles de excusas desde que hicimos nuestra primera visita, hace ya tres meses. La clave no era otra que haber realizado:

- i. Un pinchado hueco y un verticado en calles.
- ii. Un verticado en greens.

Como resultado, tenemos el actual estado del campo, que dista bien poco de lo que encontramos en anteriores visitas. Es una obviedad decir que el campo no va a llegar en condiciones al Torneo. El campo no va a poder ser presentado como nosotros quisiéramos y como creemos que se debe presentar según los estándares de calidad del Ladies European Tour.

Por lo tanto y debido a las fechas en la que nos encontramos, solo nos queda la opción de **maquillar el estado del campo**, sabiendo que el nivel de calidad que va a presentar el día de inicio del Torneo va a ser muy inferior al exigido para este tipo de evento.



2. Estado de las diferentes áreas y acciones correctoras.

A continuación pasamos a describir el estado de las diferentes zonas del campo y las diferentes labores que se han de llevar a cabo para **maquillar** el estado actual del campo.

a. GREENS

Los greens se encuentran muy poco firmes, lentos y presentan Dollar Spot (**Foto 1**) y Brown Patch.



Foto 1. Dollar spot en greens.

A continuación, pasamos a describir las labores a realizar:

Semana del 7 al 11: Verticado y recebo. Si no se puede verticar se realizará un groomer doble a -3 ó -4. Spoon feeding Hakaphos naranja 25 kg/300l, teniéndose que aplicar 600 l/Ha. Tratamiento con Azoxystrobin a razón de 1 l/Ha,

Semana del 14 al 19: Groomer a -3 ó -4, acompañado de un recebo fino. Spoon feeding Hakaphos naranja a razón de 25 kg/300l, teniéndose que aplicar 600 l/Ha.

Semana del 21 al 27: Groomer a -3 ó -4, acompañado de un recebo fino a principios de semana. Spoon feeding Hakaphos naranja 25 kg/300l.

Durante la visita pudimos ver que los greens presentan un **exceso de riego**, debido a esto se encuentran muy blandos y presentan algas en la superficie. Por lo tanto hay que **reducir los tiempos de riego**.

Revisar la altura de corte y establecerla en 3,4 mm. Durante la visita la altura nos pareció bastante superior. Cortar a diario.

Aplicar un poco más de arena en los recebos finos.



b. TEES

La zona de las plataformas reservadas para el torneo aún no se ha cerrado al juego y las plataformas presentan una considerable falta de nivelación. El colchón que muestran no posibilita que la altura de corte sea uniforme en toda la zona reservada.

Las labores a realizar serán:

Semana del 7 al 11: Cerrar las plataformas reservadas para el torneo. Pinchado macizo, seguido de un abonado y un recebo para intentar nivelar en la medida de lo posible las plataformas.

Aumentar la frecuencia de corte, 4 veces por semana.

c. CALLES

La situación de esta zona del campo es la más preocupante, puesto que se encuentra prácticamente igual que en la primera visita de hace tres meses. **En todos los anteriores informes ya se informo de que el problema era el thatch acumulado y se os dio la solución, que no era otra que el eliminar el exceso de materia orgánica mediante un verticado y un pinchado.** No obstante, sólo se ha llevado a cabo un rajado en las calles y como consecuencia tenemos el estado actual de las calles.

Es sabido que el thatch impide la absorción adecuada de nutrientes en el suelo. Y por lo tanto, también en la planta. Esto se puede observar en la **foto 2**, donde debido a un abonado realizado de manera incorrecta, podemos observar líneas de color verde donde la dosis de abonado ha sido el doble de la que se estaba aplicando, mientras que el resto de la calle permanece de color amarillo. La innumerable presencia de Fairy ring (anillo de bruja) es también consecuencia directa de este exceso de materia orgánica (thatch).



Foto 2. Zona de un verde más intenso debido al mayor aporte de fertilizante.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

Siempre se nos ha hablado de que el problema de las calles era la temperatura, que en Buenavista existe un microclima diferente y que las temperaturas eran demasiado bajas para el desarrollo de la Bermuda. Sin embargo, los tees están verdes y la hierba muy activa. Por lo tanto, queda claro que el problema de las calles es el excesivo colchón (**Foto 3**), como venimos manteniendo desde un principio en todos nuestros informes.

Esta zona del campo será imposible de recuperar para el torneo pero al igual que en otras zonas intentaremos **maquillarla**. Será imposible tener un anillo de semirough y la diferenciación entre calle y rough será mínima (**Foto 4**).



Foto 3. Colchón en una calle.



Foto 4. Falta de diferenciación de las zonas.

Las labores a realizar serán las siguientes:

Semana del 7 al 11: Abonado con **nitrato cálcico a razón de 30 gr/m² (300 kg/Ha)**. Esta **labor** debido a la cantidad de abono aplicada **es muy peligrosa** y se ha de realizar de la siguiente manera:

- i. Se realizará primero en 9 hoyos y luego en los otros 9 al día siguiente. **Cerrando al juego los 9 hoyos en los que se aplique.**
- ii. La **calibración** de la abonadora ha de ser minuciosa y más que correcta.
- iii. El **solape ha de ser perfecto**, si es necesario se puede marcar con banderas la zona por donde ha de pasar el tractor para asegurar un correcto solape.
- iv. Se aplicarán **dos ciclos de 10 minutos de riego para deshacer el abono**. Uno tras la aplicación y otro a la hora siguiente.
- v. El abonado se ha de realizar a **primera hora de la mañana y el viento ha de ser inexistente**.

De no seguir estas recomendaciones, no nos haremos responsables del resultado.

Aumentar la frecuencia de corte y disminuir los tiempos de riego.



d. ROUGH

La situación del rough es la misma que la de las calles. De hecho, no existe casi diferenciación entre el rough y las calles (**Foto 5**).



Foto 6. Malas hierbas en el rough.



Foto 5. Falta de diferenciación de las zonas del campo.

Las labores a realizar serán las mismas que en las calles. También se han de eliminar las malas hierbas (**Foto 6**) con las desbrozadoras de hilo.

e. BUNKERS

Las tareas a realizar en bunkers serán:

- i. Recuperar las zonas con falta de cobertura.
- ii. Alternar las zonas de entrada y salida de la moto de bunkers.
- iii. Realizar un perfilado y limpieza de las zonas de alrededor de los bunkers.

f. ANTEGREENS

Por motivos que desconocemos, se decidió ampliar los antegreens de un modo poco ortodoxo. Es decir, en lugar de hacerlo poco a poco, se hizo de una sola vez. Prueba de ello es el marcado scalping que presentan los antegreens en la actualidad, como se puede observar en las fotos **7 y 8**.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Fotos 7 y 8. Scalping en antegreens.

Las labores a realizar serán:

- i. Abonado y recebo de las áreas afectadas.
- ii. Tepeado de las áreas que se encuentren muy dañadas y que no puedan recuperarse.

Esperamos que se sigan las pautas marcadas, ya no hay tiempo para más divagaciones. El resultado no será el óptimo, pero hay que intentar maquillar el estado del campo.

Reciban un cordial saludo.

Comité Green Section
Real Federación Española de Golf