



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME DICIEMBRE CAMPO DE GOLF DEL PARADOR DE EL SALER

Tras la visita realizada el pasado 17 de Noviembre, durante la disputa del Torneo de Patrocinadores, pasamos a describir el estado del campo y las labores a realizar durante el próximo mes de Diciembre.

El estado general del campo era excepcional, todo el mundo quedo muy satisfecho tras el Torneo y todo eran parabienes. Esto es, sin duda, merito de la gestión de Dña. Marian Montero y del equipo de mantenimiento, comandado por D. Mario Ballester. Desde aquí, queremos felicitar a todos ellos por el fructífero trabajo realizado durante todo lo que llevamos de año.

La climatología condiciono el desarrollo del Torneo y posibilito observar los puntos fuertes y débiles del campo. En primer lugar, cabe destacar la capacidad de infiltración de los greens, los cuales presentaron una gran firmeza a pesar de la precipitación caída. Por otro lado y como punto débil, se pudo observar la condición de los bunkers debido a la lluvia.

Greens

Los **greens** mostraban una gran condición, presentando un muy buen color, buena densidad, estando libres de enfermedades (**foto 1**). Con respecto a la jugabilidad, la rodada de la bola era muy uniforme y su firmeza fue el aspecto más comentado del Torneo.



Foto 1. Vista general del green #3.

El único pero es la gran presencia de grama (*Bermuda* autóctona) en algunos greens (**foto 2**). Esta circunstancia va en detrimento del aspecto estético de los greens. No obstante, como se puede observar en la **foto 2**, estas manchas están siendo colonizadas por el *Agrostis* y pronto estarán cubiertas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Mancha de *Bermuda* en un green.

Las labores recomendadas para el mes de Diciembre son:

1. Semana del **5 al 9**: *Spoon feeding* con Hakaphos violeta (35 Kg/Ha) y *Enraigard* (2 l/Ha). Con un volumen de aplicación de 600 l/Ha y acompañado de un riego posterior de 4-5 minutos.
2. Semana del **12 al 16**: Micropinchado. Recomendamos realizar un verticado ligero en los greens 17 y 18 y un microrecebo en todos los greens del recorrido.
3. Semana del **19 al 23**: Tratamiento fungicida-alguicida con *Clortalonil* a una dosis de 4 l/Ha y *Azoxystrobin* a una dosis de 1,5 l/Ha. Con un volumen de aplicación de 600 l/Ha.
4. La frecuencia de corte será diaria.
5. La posición de bandera se cambiará, como mínimo, tres veces por semana.

Antegreens, Tees y Calles

Los **antegreens** mostraban una buena densidad pero se pudo observar que el no haber realizado un verticado previo a la resiembra, la ha condicionado. Pudiéndose observar una gran cantidad de grama en estos (**fotos 3 y 4**).



Foto 3 y 4. Detalle de la población de *Bermuda* en antegreens.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



La cobertura de ryegrass, en **calles**, es completa. Estas presentaban un gran aspecto y el corte en diamante resaltaba el contraste de color de la variedad elegida para la resiembra (**foto 5**).



Foto 5. Vista de la calle #1.

En los nuevos **tees**, seguiremos el mismo mantenimiento que en antegreens y calles. Se seguirá con las obras de remodelación de las plataformas de tee.

Las labores recomendadas para este mes son:

1. Semana del **5 al 9**: Tratamiento fungicida con *Metil-tiofanato* (a una dosis de 1 kg/1000l) y Clortalonil (3 l/Ha). Con un volumen de aplicación de 300 l/Ha.
2. Se recomienda un **recebo liviano** de las plataformas de **tee** recién tepeadas y realizar un abonado granular con Floranid Permanent a una dosis de 20-30 gr/m².
3. Se recomienda establecer una frecuencia de 3 cortes semanales. Prestando especial atención a la calidad de corte. En la última visita pudimos comprobar leves deficiencias en la calidad de corte de las plataformas de tee.
4. Se recomienda emplear el tiempo que se ahorra al reducir la frecuencia de corte, en recebar chuletas, con arena y semilla, en tees y calles.

Rough

El rough presenta una muy buena densidad y color (**foto 6**), existiendo una clara diferenciación entre calle, semirough y rough.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 6. Vista del rough donde se puede observar la definición de las diferentes zonas.

Tan solo recomendamos seguir con una buena frecuencia de corte que contribuya al desarrollo del ryegrass y a que no se acumulen restos de siega.

Bunkers

Los bunkers se encontraban muy bien presentados, presentándose muy bien perfilados. No obstante y como comentamos al principio del informe, las precipitaciones recogidas durante el Torneo, nos permitieron ver la respuesta de los bunkers a estas (**foto 7**). Observándose una compactación de estos y la formación de charcos.



Foto 7. Bunker durante el Torneo, donde se pueden observar charcos.

Por lo tanto, en la próxima visita habrá que valorar las acciones necesarias para solventar este problema.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Mientras tanto, se continuará con el mantenimiento rutinario que consiste en:

1. Rastrillado 2 ó 3 veces por semana.
2. Alternar las zonas de entrada y salida de la moto de bunkers. Las zonas que se encuentran desgastadas debido al tráfico de la moto de bunkers, se sembraran y se cerraran al tráfico para que se puedan recuperar.
3. Aporte de arena en los bunkers que sea necesario para mantener el mismo nivel de arena en todos los bunkers del recorrido.
4. Perfilado si fuese necesario.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf