

INFORME DE DAÑOS EL SALER AGOSTO DE 2011

Con motivo de los hechos acontecidos el pasado 19 de Agosto en el Parador de El Saler, donde fueron sustraídos los cables de alta tensión que dan suministro al grupo de impulsión que abastece al sistema de riego del campo de golf, las instalaciones del campo de golf permanecieron sin suministro de agua durante 5 días (periodo comprendido del 19 de Agosto al 23 del mismo mes). Durante dicho periodo de tiempo el campo se vio sometido a un fuerte estrés hídrico que ha provocado numerosos daños en calles y greens.

Agosto, debido a las altas temperaturas (con una temperatura media de 31 °C) y a la elevada tasa de evapotranspiración de la planta, es un mes en el que las cespitosas tienen unos elevados requerimientos hídricos. Estos han de ser satisfechos de forma diaria para garantizar un adecuado desarrollo y supervivencia del césped. En el momento que estas necesidades no son cubiertas, los procesos fisiológicos de la planta se ven alterados. Produciéndose, bajo estas condiciones, la muerte de la planta en un periodo de 48 a 72 horas.

A continuación, se detallan los daños producidos en las diferentes áreas del campo:

GREENS

Se trata de una superficie de césped de elevada calidad y que requiere un mantenimiento exhaustivo para estar siempre en unas condiciones óptimas para el juego. La mayoría del juego se desarrolla en estas superficies, suponiendo un grave perjuicio para el campo cualquier daño en ellas. La mayoría de greens de El Saler están constituidos en un 80 % por *Poa annua*, siendo esta una especie es muy sensible al estrés hídrico. La imposibilidad de utilizar el sistema de riego ha provocado la pérdida de la cobertura de césped de los greens #3 y #16 (**fotos 1 y 2**). Siendo necesario implantar nuevos tepes para poder restablecer dichos greens y ponerlos al juego en condiciones óptimas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Fotos 1 y 2. Pérdida de cobertura de césped en greens ocasionada por el estrés hídrico.

CALLES

Es sin duda el área del campo que más se ha visto afectada por este periodo de estrés hídrico, produciéndose una gran pérdida de la cobertura de césped (**fotos 3 y 4**).



Foto 3. Detalle de los daños ocasionados en calles.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Pérdida de densidad ocasionada por el estrés hídrico.

Por lo tanto, será necesaria una resiembra total de estas superficies para poder recuperarlas y ponerlas en juego ofreciendo la misma calidad que tenían antes de que sucedieran los hechos.

Departamento Green Section
Real federación Española de Golf