



Lolium perenne

HEADSTART II

Ideal para overseeding

Obtención:

- Headstart II es una variedad de obtención americana diseñada especialmente para overseeding.
- La semilla se multiplica en Oregón bajo estándares de calidad OECD.
- El control de calidad es excelente mediante marcadores moleculares, test de fluorescencia y análisis clásicos de pureza y germinación llevados a cabo en el laboratorio oficial en Oregón y en nuestro laboratorio de I+D de Barcelona.

Características:

- Variedad de establecimiento muy rápido y excelente comportamiento invernal.
- Alcanza densidades altas en poco tiempo evitando la competencia de la Poa annua.
- Tiene máxima resistencia a salinidad en nascencia (hasta 5 dS/m).
- Textura de hoja muy fina.
- Excelente vigor de instalación con mínimo mantenimiento.
- Color vibrante verde oscuro.
- Excelente crecimiento invernal y perfecta transición estival.
- Excelente resistencia al pisoteo y arrancamiento.
- De crecimiento lento y porte erecto.
- Ideal para superficies que se vayan a utilizar de forma rápida después de la siembra o resiembra, overseeding de campos de golf, campos de deporte y jardinería pública y privada...



CARACTERÍSTICAS

Dosis de siembra g/m ²	35 -45
Dosis resiembra g/m ²	40
Dosis overseeding calles, rough, jardinería g/m ²	50
Nº de semillas/g	525
Días a germinación	3-7
Época ideal de siembra	Primavera-otoño
Color	Muy oscuro
Establecimiento	Muy rápido
Crecimiento	Lento
Textura de hoja	Muy fina
Mantenimiento	Bajo
Necesidades nutricionales	Bajas
Tolerancia a la sombra	Media
Pérdida de color invernal	No
Resistencia a enfermedades	Leaf spot, Gray leaf spot, Dollar spot, Hilo rojo, Pythium spp, Fusarium spp.
Capacidad de recuperación	Excelente
Resistencia al pisoteo	Excelente
Tolerancia al calor	Media
Altura de corte	A partir de 5 mm
Frecuencia de corte	Media
Resistencia a salinidad	Máxima
Necesidades hídricas	Medias
Endófitos	Si



IMPLANTACIÓN Y MANEJO

- Para césped perenne se debe segar entre 10 y 50 mm. En condiciones de overseeding tolera hasta 5 mm.
- Como norma general aportar de 25 a 40 unidades de Nitrógeno por mes de crecimiento activo. Prefiere un equilibrio 4-1-3
- En condiciones de césped perenne en zonas calurosas evitar las fertilizaciones nitrogenadas durante los meses de verano.
- Tratamientos fungicidas solo si aparece la enfermedad.
- No necesita escarificados ni pinchados.
- Dar riegos espaciados y abundantes, excepto durante la instalación, donde deben ser continuos y suaves.