



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA AZAHAR

Febrero, 2012

Presentes: D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.
D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.

CAZ.1.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MES DE FEBRERO DEL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

Tras las visitas realizadas en el mes de Enero , pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Febrero.

1.GREENS

Los greens presentan un buen estado general, con una firmeza elevada, tan sólo hemos de indicar que con debido a la proliferación de variedades de clima cálido (warm season) (**foto 1**), y debido a su latencia invernal presentan manchas de color marrón y falta de densidad debido a que no han sido colonizados por la cantidad de Poa Annua de otros años.



Foto 1. Green 5 de Club de Golf Costa Azahar.

Tras realizar varias catas en la zona radicular de los greens, hemos podido apreciar una densa capa negra (**foto 2**) que impide que las raíces prosperen hacia abajo, por lo que hemos planificado el uso de maquinaria específica para este fin en el pinchado de Febrero, consistente en un pinchado en profundidad con disrupción de la zona afectada. Recurriremos al alquiler de la máquina, ya que debido al poco uso de la misma no es rentable la adquisición de la misma.



Foto 2. Black layer en greens

En la zona del vivero (**foto 3**) se aprecia excesiva sombra como para desarrollar tepes de calidad, por lo que hay que podar los árboles para dejar pasar la luz. Este vivero se puede sembrar de alguna variedad agresiva para su utilización en la renovación paulatina de greens.



Foto 3. Vivero de greens.

Durante el mes de Febrero se deben realizar las siguientes tareas:

1. Fertilización granular con 12-6-24 a dosis de 15 g/m². la semana del 13 de Febrero.
2. Pinchado con Vertidrain la semana del 27 de Febrero.
3. Fertilización granular con 18-24-5 a dosis de 15 g/m² tras el pinchado.
4. Aplicación de Clortalonil a dosis de de 3 l/ha.

A lo largo de este mes determinaremos si es necesario añadir semilla en el pinchado de Marzo dependiendo de la cantidad de Poa Annua presente en los greens.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees (**foto 4**) presentan un estado óptimo para el juego, ya que son continuamente recebados con sumo cuidado y se elige escrupulosamente la zona de colocación de las marcas de salida.

Los antegreens presentan una alta población de variedades de clima cálido (warm season), por lo que su color ahora mismo es marrón. En la próxima resiembra hay que hacer mas hincapié en estas zonas, pues su densidad es muy pobre, además el carácter rizomático de estas variedades hacen que el green sea invadido. Otra práctica de ayuda es la continua dirección del tráfico para no estresar en exceso la planta.



Foto 4. Tees con chuletas recebadas.

Durante el mes de Febrero las tareas a realizar a los tees y antegreens durante el mes de Febrero son:

1. Continuar recebando con semilla las chuletas.
2. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3.CALLES

Las calles presentan una gran densidad (**foto 6**) de planta y un aspecto perfecto para la práctica del golf. Aquí nos encontramos con un problema de acumulación de aguas en zonas bajas (**foto 5**) que se está atajando progresivamente, fijándose este año como meta el hacer 450 metros de drenajes entre la calle 5 y la calle 8.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 5. Acumulación de agua en zonas bajas.



Foto 6. Calle con densidad homogénea.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las chuletas en calle se receban constantemente, por lo que le da un aspecto estético de mantenimiento fabuloso (**foto 7**).



Foto 7. Recebo de chuletas de calle.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE FEBRERO EN CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

GREENS.

- Semana 13-19: Abonado granular con 12-6-24 a 150 Kg/ha.
- Semana 13-19: Tratamiento Clortalonil a 3 l/ha.
- Semana 27-4: Aerificado con Vertidrain, recebo y abonado granular con 18-24-5 a 150 Kg/ha.

TEES Y ANTEGREENS.

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.

CALLES.

Rutina:

- Continuar con los drenajes.
- Continuar recibiendo las chuletas de calle.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf

