



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA DE AZAHAR

Junio, 2012

Presentes: D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.
D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.

CAZ.5.2012

INFORME MES DE JUNIO DEL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

Tras las visitas realizadas en el mes de Mayo , pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Junio.

1.GREENS

En este mes se ha llevado a cabo otro pinchado en los greens (ésta vez en hueco, aunque a una profundidad normal), que presentaban un buen estado de firmeza, densidad y cobertura.

Dada la composición de la zona radicular (**Foto 1**) que hay en los greens es muy difícil conseguir un apropiado desarrollo de las raíces (**Foto 2**), por lo que se prevee que no estén en un estado del todo óptimo en la época de máximo estrés, lo que significa que queda mucho por hacer en éste apartado.

A pesar de todo, tal y como puede apreciar el pinchado en profundidad (**Foto 3**) que se hizo a finales de Febrero fue todo un éxito y es la causa de las pocas raíces que se han podido desarrollar normalmente a día de hoy, por lo que hay que incluirlo en el planning de forma periódica hasta que consigamos mejorar la composición de la zona radicular.



Foto 1. Zona radicular.



Foto 2. Zona radicular sin raíces.



Foto 3. Arena introducida en el pinchado anterior.



Foto 4. Raíces de variedades de warm season que han invadido el green

En los restos del pinchado (Foto 4) se puede apreciar las raíces de las variedades de clima cálido (warm season) que tienen invadidos los greens y que son las responsables de las manchas marrones que aparecen en invierno y cada año se hacen mas grandes, de ahí que se introduzca una variedad de crecimiento más agresivo que ofrezca algo mas de resistencia tanto a la *Poa Annua* como a estas otras variedades.

En cualquier caso llama la atención que en distintas zonas cercanas de green, el estado de la zona radicular es muy distinto entre ellas, lo que se achaca al deficiente sistema de riego y la diferente cobertura en cada una de esas zonas, que hace que se reciban unas cantidades muy distintas de agua.



Foto 5. Pinchos huecos de expulsión lateral.

Al no estar muy seguros de la capacidad de recuperación con los pinchos huecos (**Foto 5**) de mayor diámetro posible (19 mm), se ha realizado el pinchado con los de 16 mm y los superiores se han utilizado tan sólo para los chipping greens. Se ha podido comprobar que a efectos de juego ha sido totalmente igual que con los inferiores, pero en cambio la cantidad de arena utilizada para tapar los agujeros ha sido notablemente mayor, lo que significa que a partir de ahora utilizaremos únicamente los de 19 mm.

Durante el mes de Junio se deben realizar las siguientes tareas:

1. Spoon feeding con abono foliar 15-5-30 a dosis de 18 kg/ha la semana del 4 de Junio.
2. Aplicación preventiva de fungicida a base de azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 4 de Junio.
3. Verticado y recebado liviano la semana del 11 de Junio.
4. Fertilización a base de abono granular con 15-0-26 a dosis de 20 g/m² la semana del 25 de Junio.
5. Micropinchado y recebado liviano la semana del 25 de Junio.
6. Aplicación de tratamiento humectante a una dosis de 10 l/ha la semana del 25 de Junio.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Rutinas:

- Frecuencia de corte de al menos 5 veces a la semana con vuelta de limpieza 3 veces por semana en tripleta y siempre con las manuales, a una velocidad adecuada para definir el contorno original del green.
- Cambio de bandera 3 veces por semana.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees y antegreens presentan un estado muy bueno, se han abonado y pinchado en macizo. No presentan enfermedades ni exceso de compactación.

Durante el mes de Junio las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Fertilización con abono granular 15-5-20 a una dosis de 150 kg/ha la semana del 4 de Junio.
2. Aplicación preventiva a base de fungicida azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 4 de Junio.
3. Pinchado macizo la semana del 4 de Junio.
4. Continuar recebando con semilla las chuletas.
5. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3. CALLES

Las calles continúan mostrando un color y densidad muy buenos. En éste mes se procederá a revisar las unidades de la máquina de calles de forma que se consiga un corte perfecto.

Se han abonado recientemente para el crecimiento primaveral.

Durante el mes de Junio no hay aplicaciones importantes ni tareas a realizar a las calles y rough.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE JUNIO EN CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR.

GREENS.

- Semana 4-10: Abonado foliar con 15-5-30 a 18 kg/ha.
- Semana 4-10: Tratamiento con azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 11-17: Verticado y recebado.
- Semana 25-1: Abonado granular con 15-0-26 a dosis de 20 g/m².
- Semana 25-1: Micropinchado y recebado.
- Semana 25-1: Tratamiento humectante a 10 l/Ha.

Rutina:

- Cambio de bandera 3 veces por semana.
- Frecuencia de corte de al menos 5 veces a la semana con vuelta de limpieza 3 veces por semana en tripleta y siempre con las manuales, a una velocidad adecuada para definir el contorno original del green.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 4-10: Abonado granular con 15-5-20 a 150 kg/ha.
- Semana 4-10: Tratamiento azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 4-10: Pinchado macizo.

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.

CALLES.

Rutina:

- Continuar recebando las chuletas de calle.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa de Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf

