



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF DE COSTA AZAHAR

Marzo, 2012

Presentes: D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.
D. Mikelo Requena, Greenkeeper de Club de Golf Costa Azahar.

CAZ.2.2012



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



INFORME MES DE MARZO DEL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR.

Tras las visitas realizadas en el mes de Febrero , pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Marzo.

1.GREENS

Los greens presentan cierta mejoría en respecto a la densidad frente al mes pasado debido a la aplicación de abono foliar, si bien el color es pardo debido al daño producido por el frío y a la ausencia de riego. Están muy firmes y se les ha realizado un pinchado macizo en profundidad, teniendo que renunciar al hueco tras varios intentos al ser extremadamente escasa la longitud de las raíces de la planta por la presencia de capa negra (black layer). Se le seguirán aportando arena hasta que los agujeros queden completamente tapados.

En el proyecto de modificación del recorrido de juego se plantea como mejor opción la de situar el nuevo green en la situación de la actual calle 9 **(Foto 1)**, ya que de hacerlo al fondo del campo **(Foto 2)** éste se verá perjudicado por la sombra y las raíces de la cantidad de pinos que hay.



Foto 1. Situación favorable de green.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Situación desfavorable de green.

Durante el mes de Marzo se deben realizar las siguientes tareas:

1. Spoon feeding con 25-0-0 + Fe a 20 l/ha la semana del 19 de Marzo.
2. Aplicación preventiva de fungicida Azoxistrobín a dosis de 1,5 l/ha.

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees presentan buen aspecto general, aunque debido al frío no se han cortado ni recebado las veces deseadas, por lo que su densidad empieza a disminuir (**foto 3**), aunque con el pichado, resiembra y recebo de Marzo y la climatología en pleno ascenso no se contempla como un problema. El criterio con el que se elige la zona de colocación de las marcas de salida es el adecuado.



Foto 3. Densidad pobre.

Durante el mes de Marzo las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Pinchado, resiembra de Ryegrás a dosis de 400 kg/ha y recebo la semana del 5 de Marzo.
2. Fertilización con 17-24-9 a dosis de 200 kg/ha.
3. Aplicación preventiva de fungicida Propiconazol a dosis de 1,5 l/ha la semana del 26 de Marzo.
4. Continuar recebando con semilla las chuletas.
5. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.CALLES

Las calles presentan una gran densidad de planta y un aspecto perfecto para la práctica del golf. Los drenajes de calle están casi terminados y los pozos de regida pendiente de tapar. Se aprecia en casi todas las calles marcas de pisadas impregnadas en herbicida (**Foto 4**). Hay que tomar medidas urgentes para que no vuelva a pasar, ya que es peligroso para zonas más sensibles (green y antegreen) y da una imagen bastante mala.



Foto 4. Pisadas impregnadas en herbicida.

Debido al continuo y fuerte viento las calles presentan restos de hojas de pino en abundancia (**Foto 5**). Esto se puede solucionar con la adquisición de una máquina sopladora (tipo búfalo).



Foto 5. Restos de hoja de pino en calles.

Durante el mes de Marzo, las tareas a realizar a las calles y rough son:

1. Fertilización con 15,5-0-0 a dosis de 150 kg/ha la semana del 5 de Marzo.
2. Terminar los drenajes.
3. Limpieza de hojas de pino.

4.BUNKERS

Presentan un estado óptimo, aunque hay que esforzarse en mantener el talud y la zona mas próxima de green limpio de arena (**foto 6**) para no perjudicar a la planta ni a las cuchillas de las máquinas de corte.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 6. Arena en talud y green.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE MARZO EN CLUB DE GOLF COSTA DE AZAHAR.

GREENS.

- Semana 19-25: Spoon feeding con 25-0-0 y Fe a 10 l/ha.
- Semana 26-1: Tratamiento con Azoxistrobín a 1,5 l/ha.

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 5-11: Pinchado de tees y antegreens con pinchos huecos de 16 mm.
- Semana 5-11: Resiembra de tees y antegreens a 400 kg/ha.
- Semana 5-11: Abonado de tees y antegreens con 17-24-9 a 200 kg/ha.
- Semana 26-1: Tratamiento de tees y antegreens con Propiconazol a 1,5 l/ha.

Rutina:

- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.

CALLES.

- Semana 5-11: Abonado en calles y rough con 15,5-0-0 a 150 kg/ha.

Rutina:

- Terminar los drenajes.
- Continuar recebando las chuletas de calle.

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Costa de Azahar.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf

