



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF JÁVEA

Mayo, 2012

Presentes: D. Gaspar Cruaños, Greenkeeper de Club de Golf de Jávea.
D. Juan Muñoz , Técnico Green Section.

JAV.5.2012

INFORME MES DE MAYO DEL CLUB DE GOLF JÁVEA.

Tras las visitas realizadas en el mes de Abril, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Abril.

1.GREENS

La altura de los greens se ha llevado a 3 mm y se han dejado de utilizar las máquinas de corte con recebo. El estado de los greens es firme y uniforme con una densidad adecuada, si bien han tardado un poco más de lo previsto en recuperar totalmente. Lo achacamos a no haber podido aplicar antes del pinchado el fertilizante previsto en el planning anual (no había temperatura suficiente para el granular ni teníamos equipo de pulverización para el foliar), muestra de ello es que apareció red thread (hilo rojo) (**foto 1**), cuya causa principal es la deficiencia en nitrógeno. Esta carencia se ha subsanado aplicando fertilizante líquido 25-0-0 a una dosis de 10 l/ha y actualmente están totalmente recuperados (**foto 2**).



Foto 1. Red thread (hilo rojo) en green.



Foto 2. Red thread (hilo rojo) recuperado.

Durante el mes de Mayo se deben realizar las siguientes tareas:

1. Aplicación de tratamiento fungicida de forma preventiva a base de azoxistrobín a dosis de 1 l/ha la semana del 1 de Mayo.
2. Spoon feeding a base de abono foliar 15-5-30 a dosis de 37 kg/ha la semana del 7 de Mayo.
3. Aplicación de tratamiento insecticida de forma preventiva a base de imidacloprid a dosis de 2 l/ha la semana del 7 de Mayo.
4. Verticado y recebo muy liviano la semana del 14 de Mayo.
5. Spoon feeding a base de abono foliar 15-5-30 a dosis de 37 kg/ha la semana del 21 de Mayo.
6. Aplicación de tratamiento fungicida de forma preventiva a base de propiconazol a dosis de 1,5 l/ha la semana del 21 de Mayo.
7. Micropinchado la semana del 21 de Mayo.
8. Aplicación de humectante a dosis de 10 l/ha la semana del 21 de Mayo.

9. Cambio de bandera 3 veces por semana.
10. Corte de greens 5 veces a la semana a una altura de 3 mm con vuelta de limpieza 3 veces por semana

2. TEES Y ANTEGREENS

Los tees y antegreens presentan un buen estado, mostrando una definición y densidad muy elevada. Se han pinchado en macizo y se van a abonar y verticar la semana que viene.

Hay que continuar moviendo las marcas de los tees (**Foto 3**) de forma inteligente (siempre hacia atrás) para mantener la superficie con la mayor cobertura posible.



Foto 3. Tee recuperado.

En los antegreens (**Foto 4**) hay que hacer hincapié en mover con frecuencia las cuerdas para dirigir el tráfico por sitios distintos, ya que al no hacerlo lo suficiente las zonas de entrada a green y de paso constantese compactarán rápidamente

descendiendo la densidad y acabando por desaparecer la hierba en esos lugares.



Foto 4. Tráfico dirigido en antegreen.

Durante el mes de Mayo, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Aplicación de insecticida líquido a base de imidacloprid a dosis de 2 l/ha la semana del 7 de Mayo.
2. Aplicación de fungicida de forma preventiva a base de azoxistrobín a una dosis de 1 l/ha la semana del 14 de Mayo.
3. Verticado superficial de antegreens y tees de bermuda la semana del 7 de Mayo.
4. Continuar recebando con semilla las chuletas.
5. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).

3.CALLES Y ROUGH.

Las calles y el rough presentan un magnífico estado (**foto 5**). La semana que viene se van a abonar con urea a una dosis de 25 g/m^2 (recomendamos dividirlo en dos aplicaciones para prevenir quemar la superficie de la hoja) y se van a verticar de cara al verano para reducir el colchón que forma la bermuda y mejorar la textura de la hoja, ya que está empezando a entrar en crecimiento con el ascenso de las temperaturas.



Foto 5. Vista de las calles.

Durante el mes de Mayo, las tareas a realizar en calles y rough son:

1. Verticado ligero de calle la semana del 7 de Mayo.
2. Fertilización con 46-0-0 a dosis de 250 kg/ha la semana del 1 de Mayo.

RESUMEN DE ACTUACIONES DURANTE MAYO EN CLUB DE GOLF JÁVEA.

GREENS.

- Semana 1-6: Tratamiento con azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 7-13: Spoon feeding con 15-5-30 a 37 kg/ha.
- Semana 7-13: Tratamiento con imidacloprid a 2 l/ha.
- Semana 14-20: Verticado y recebo liviano.
- Semana 21-27: Spoon feeding con 15-5-30 a 37 kg/ha.
- Semana 21-27: Tratamiento propiconazol a 1,5 l/ha.
- Semana 21-27: Micropinchado.
- Semana 21-27: Tratamiento humectante a 10 l/ha.
- Cambio de bandera 3 veces por semana.
- Corte de greens 5 veces a la semana a una altura de mm con vuelta de limpieza 3 veces por semana

TEES Y ANTEGREENS.

- Semana 7-13: Tratamiento de imidacloprid a 2 l/ha.
- Semana 14-20: Tratamiento de azoxistrobín a 1 l/ha.
- Semana 7-13: Verticado superficial de antegreens y tees de bermuda.
- Recebado de chuletas de tees con semilla.
- Mover las marcas de salida siempre de adelante hacia atrás.

CALLES.

- Semana 7-13: Verticado ligero de calles
- Semana 1-6: Abonado con 46-0-0 a 250 kg/ha.
- Continuar recibiendo las chuletas de calle.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Jávea.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf

