



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CLUB DE GOLF JÁVEA

Febrero, 2013

Presentes: D. Gaspar Cruaños, Greenkeeper de Club de Golf de Jávea.
D. Juan Muñoz, Técnico Green Section.

JAV.2.2013

INFORME MES DE FEBRERO DEL CLUB DE GOLF JÁVEA.

Durante el mes de Enero el campo ha experimentado una notable mejoría, ya que las condiciones climatológicas han favorecido al desarrollo de la planta y los cortes vuelven a darle orden al recuperar la definición con las marcas de corte.

A lo largo de este mes se va a realizar tanto la preparación como el pinchado hueco de greens, por lo que es crucial respetar las fechas marcadas para las labores de fertilización y aplicaciones de fitosanitarios con el fin de asegurar tanto una correcta ejecución de la labor como una pronta recuperación de esta superficie que ofrezca una jugabilidad apropiada en el menor tiempo posible, para lo cual es absolutamente necesario tener preparados todos los elementos que se van a utilizar de antemano.

Dado que el crecimiento de la planta es lento en estos momentos del año se están realizando otras tareas en el campo ajenas al mantenimiento tales como caminos de hormigón, retirada de palmeras muertas, replanteo de vallas perimetrales (**Foto 1**), etc. Estas prácticas se deben efectuar tan sólo mientras el campo tenga el mantenimiento asegurado y en el futuro, ante la reducción del personal programada hay que asumir que se tendrán que subcontratar todas las tareas ajenas al mantenimiento directo y que incluso en estaciones en las que la planta está en pleno crecimiento habrá que contratar personal eventual, algo que posiblemente sea una situación extraña de asumir por el club.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF




Foto 1. Replanteo de la valla green # 3

Tras las visitas realizadas en el mes de Enero, pasamos a analizar el estado actual del campo y las labores a realizar durante el mes de Febrero.

1.GREENS

Los greens presentan un color verde muy intenso tras la última aplicación en spoon feeding de fertilizante foliar (**Foto 2**), si bien no presentan una firmeza extraordinaria debido a los riegos a los que se les ha sometido en los últimos días para acabar con las secas producidas por la alta incidencia de los vientos presentes en el campo durante las últimas semanas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 2. Aspecto general de los greens.

Tras la propuesta de la directiva del club de elevar la altura de corte de los greens para reducir la velocidad aconsejamos que no se lleve a cabo, pues la altura actual (4 mm) la consideramos como tope máximo y un incremento produciría el acostamiento de la planta con total seguridad, reduciendo un empeoramiento de la superficie de juego.

Lo rodadura de la bola es homogénea a pesar no tener una frecuencia de corte diaria y están completamente libres de colchón (**Foto 3**) y de enfermedades, por lo que se debe seguir vigilando la calidad del corte si se quiere seguir en esta línea.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 3. Perfil de la zona radicular de los greens.

Los trabajos de retirada de rizomas se continúan de forma apropiada. Es una tarea lenta pero necesaria para ofrecer unos greens limpios y homogéneos libres de invasiones.

Ante el mal resultado que se producía de la superficie de juego como consecuencia de los micropinchados en los greens, se han realizado pruebas en el chipping green utilizando los pinchos con forma de cruz (**Foto 4**), propiciando una superficie injugable al levantar toda la superficie (**Foto 5**), por lo que se seguirán haciendo pruebas con distintos ajustes de la máquina de airear con el fin de conseguir llevar a cabo esta labor tan importante para la buena salud de la planta y el buen estado de la superficie de juego.

De cualquier manera hay que asegurarse de que la pinchadora de greens está perfectamente ajustada antes de realizar labores de aireación en los greens, ya que de lo contrario se pueden producir graves daños en la superficie de juego.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4. Pinchos en forma de cruz.



Foto 5. Zona de pruebas levantada.

Durante el mes de Febrero se deben realizar las siguientes tareas:

1. Fertilización a base de abono granular 18-6-18 a una dosis de 15 g/m² la semana del 4 de Febrero.
2. Aplicación de fungicida a base de Clortalonil a una dosis de 3 l/ha la semana del 18 de Febrero.
3. Aireación de greens mediante pinchado hueco y recebado la semana del 18 de febrero.
4. Fertilización a base de abono granular 18-22-5 a una dosis de 20 g/m² la semana del 18 de Febrero.
5. Cambio de bandera 3 veces por semana.
6. Corte de greens 3 veces por semana a una altura de 3 mm con vuelta de limpieza cada dos días.

2. TEES Y ANTEGREENS

En este mes comienzan tanto las primeras aplicaciones de fertilizante granular como las de fungicidas preventivos, ya que se espera el comienzo del crecimiento de la planta y se deben cubrir todas las necesidades.

Los tees presentan un estado de densidad excepcional, color verde intenso, definición muy marcada y están totalmente libres de enfermedades (**Foto 6**). Es el resultado de una correcta gestión de la plataforma de los tees, por lo que hay que seguir en esta dirección de trabajo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 6. Estado general de los tees.

Ante la propuesta de la dirección del club de utilizar una mezcla de turba con arena en los depósitos de arena disponibles que para los jugadores reparen la plataforma tras golpear la bola lo desaconsejamos totalmente, ya que debido a la gran cantidad de arena que se emplea por parte de los jugadores crearía un layering en la plataforma del tee por muy poca cantidad que se introdujera en la mezcla y acabaría con la homogeneidad en la composición del perfil del suelo de los tees.

Los antegreens, al igual que los tees presentan una densidad sobresaliente, color verde intenso y están completamente libres de enfermedades. Como punto negativo se puede observar en todos los antegreens del recorrido que al realizar la resiembra se han producido algunos fallos como resultado de no acercar la máquina de sembrar lo suficiente al filo del green (**Foto 7**). Se aconseja aportar algo de semilla de forma manual en estas áreas, ya que es una zona altamente estratégica para el juego.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 7. Estado de los antegreens.

Durante el mes de Febrero, las tareas a realizar a los tees y antegreens son:

1. Fertilización a base de abono granular 20-5-10 a una dosis de 20 g/m² la semana del 18 de Febrero.
2. Aplicación preventiva de fungicida a base de Clortalonil a una dosis de 3 l/ha la semana del 18 de Febrero.
3. Continuar recebando con semilla las chuletas.
4. Mover las marcas de salida de forma inteligente (siempre hacia atrás).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3.CALLES Y ROUGH.

Las calles presentan un aspecto muy bueno, tan sólo penalizado por los fallos realizados por el operario que manejaba la máquina sembradora en los solapes (**Foto 8**). De cualquier manera estos fallos han sido resemebrados a posteriori y se espera que se desarrolle la planta de forma que se obtenga un aspecto homogéneo. La próxima vez se debe señalar de forma más exhaustiva los filos de cada pasada para que no vuelva a suceder.

Aún así el estado general es de poseer una densidad abundante, definición marcada, firmeza y ausencia de enfermedades.




Foto 8. Aspecto general de las calles.

Las chuletas de calle se siguen recibiendo a base de una mezcla de arena y semillas, pudiéndose añadir un poco de turba en caso de que el greenkeeper lo considere necesario en función de la zona del campo a reparar. Parece una labor completamente engorrosa la propuesta de



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



reparar las zonas de chuletas con pequeños tepes, ya que aparte del elevado coste que supondría el club no posee plantilla para llevar a cabo este tipo de labores, aparte de otros muchos puntos que pondrían en duda la viabilidad de estos pequeños tepes.



Foto 9. Recebo de chuletas en calle.

Durante el mes de Febrero, las tareas a realizar en calles y rough son:

1. Fertilización a base de abono granular 15.5-0-0 a una dosis de 200 kg/ha la semana del 18 de Febrero.
2. Aplicación preventiva de fungicida a base de Clortalonil a una dosis de 3 l/ha la semana del 18 de Febrero.
3. Recebo de las chuletas de calle con una mezcla de semilla y arena de forma rutinaria.

TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR MES DE
FEBRERO 2013

SEMANA	GREENES	TEES Y ANTEGREENES	CALLES Y ROUGH
4-10	15 g/m ² 18-6-18		
11-17			
18-24	3 l/ha Clortalonil Pinchado hueco y recebado 15 g/m ² 18-22-5	200 kg/ha 20-5-10 3 l/ha Clortalonil	200 kg/ha 15.5-0-0 3 l/ha Clortalonil
25-3			

Por último, agradecer el trato que se nos dispensa en todas nuestras visitas al Club de Golf Jávea.

Recibid un cordial saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf