



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

Laziturri S.L.

Junio, 2013

Presentes: D. Diego J. Peñapareja, Técnico Green Section

LAZ.4.2013



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El pasado mes de Junio se visitaron durante tres días las instalaciones de la Real Sociedad, Izki golf, La Grajera golf y Las Rejas golf. También se realizó el planning de tratamientos fitosanitarios para golf y fútbol.

Los aspectos más importantes a resaltar de la visita fueron los siguientes:

ANOETA Y ZUBIETA (Visita día 12 de Junio)

Los terrenos de juego de ambas instalaciones se encontraban en plena preparación para la temporada. Para tal fin se realizaron labores culturales para eliminar la materia orgánica, se resembró, se recibió y se fertilizó.

Nuestras recomendaciones fueron las siguientes:

- Usar variedades de *Lolium perenne* resistentes a gray leaf spot.
- Subir la altura de corte a 27 mm.
- Realizar los primeros cortes con segadora rotativa bien afilada.
- Dar varios ciclos de riego para garantizar la nascencia de la semilla.
- Llevar a cabo tratamientos fungicidas preventivos contra *Pythium* seedling blight y contra gray leaf spot.
- Mantener unos niveles adecuados de fertilización.

Se elaboró un calendario de tratamientos fungicidas para Anoeta y Zubieta.



Vista del terreno de juego de Anoeta tras ser recebado.

De cara a la próxima temporada y debido al aumento en la carga de juego que recibirá Anoeta, recomendamos un aumento en las labores de escarificado y recebo para mejorar la infiltración y reducir la acumulación de materia orgánica.



Vista general del campo de entrenamiento Z1 después del escarificado y la recogida de los restos.

También consideramos muy importante continuar con el empleo de reguladores de crecimiento (Trynexapac-ethyl y Etefón) para controlar la población de *Poa annua* y sus características que afectan a la jugabilidad. También conseguiremos una mayor densidad y una mejor cobertura de césped.

IZKI GOLF (Visita día 13 de Junio)

El campo, en líneas generales, se encontraba en buen estado. Todas las labores culturales realizadas han posibilitado que el campo no se haya resentido con las numerosas precipitaciones recibidas, encontrándose todas las superficies firmes. La única nota negativa es la presencia de *Fusarium* en greens debido a que este año ha sido muy propicio para la aparición de esta enfermedad y se llevan empleando las mismas materias activas fungicidas durante muchos años. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se hayan desarrollado resistencia a dichas materias activas.

En el planning fitosanitario realizado se han empleado diferentes materias activas para evitar resistencias y poder manejar las ya existentes.



Vista general de una calle de Urturi desde el green.

Debido a la elevada presencia de *Poa annua* en greens es recomendable llevar un estricto planning fungicida para prevenir el summer stress y la consecuente pérdida de densidad provocada por este.



Estado de los greens en Urturi.

Los micropinchados con pincho solido de 6 u 8 mm son muy recomendables una vez cada 20 días durante el verano. También recomendamos el empleo de groomer a – 1 mm dos veces a la semana, acompañado de un recebo muy muy fino cada 15 días.

GOLF DE LA GRAJERA (Visita día 13 de Junio)

El estado general del campo era bueno, se encontraba muy limpio, había sido fertilizado y su color había mejorado.



Vista de una calle del recorrido desde el tee.

El abonado dejó una consecuencia negativa, las plataformas de tee estaban quemadas debido a una aplicación inapropiada del abono.



Detalle de los daños causados por el abonado incorrecto.

Se abonaron dando vueltas por lo que cayó mayor cantidad de abono en el centro de las plataformas, provocando que estas se quemasen.

La manera correcta de abonar es en línea recta, calculando el ancho de trabajo de la abonadora centrífuga, calibrándola según la cantidad que se quiere aplicar y solapando solo lo correcto (mitad del ancho).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Zona con falta de cobertura de riego en un green de La Grajera.

Se observaron secas en algunos greens, recomendamos el riego de apoyo con manguera durante todo el verano, así como revisar las triangulaciones de los aspersores de green y mover alguno si fuera necesario.

Debido a la elevada presencia de *Poa annua* en greens es recomendable llevar un estricto planning fungicida para prevenir el summer stress y la consecuente pérdida de densidad provocada por este.

Recomendamos usar el groomer a 1 mm por debajo del corte (1-2 veces por semana) y acompañados de un recebo muy muy fino cada 15-20 días. Los micropinchados con pincho solido de 6 u 8 mm son muy recomendables una vez cada 20 días durante el verano.

Las zonas de los daños de jabalíes que fueron resembradas están evolucionando muy satisfactoriamente. Sería interesante evaluar la posibilidad de resembrar las zonas de calles que sufrieron daños y no fueron resembradas el año pasado.

GOLF DE LAS REJAS (Visita día 7 de Junio)

El estado general del campo era bueno, todas las superficies se encontraban dentro de corte y se percibe que se está trabajando mucho para mejorar la condición de los greens.



Vista general de una calle en Las Rejas.

Recomendamos que no se emplee la rastra metálica después de realizar recebos. Una alfombra de coco tirada por un buggy realizara la misma labor sin ser tan agresiva. También recomendamos disminuir la dosis de arena que se aporta en los recebos, esta ha de ser mínima para no dañar las cuchillas.

Debido a la elevada presencia de *Poa annua* en greens es recomendable llevar un estricto planning fungicida para prevenir el summer stress y la consecuente pérdida de densidad provocada por este.



Vista de un green donde se puede ver una zona con menor densidad.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Recomendamos usar el groomer a 1 mm por debajo del corte (1-2 veces por semana) y acompañados de un recebo muy muy fino cada 15-20 días. Los micropinchados con pincho solido de 6 u 8 mm son muy recomendables una vez cada 20 días durante el verano.

Durante nuestra visita se midió la velocidad de los greens con un stimpmeter, obteniendo unos valores medios de 8,2 pies.

También se revisaron todos los greens del campo, determinado que es necesario mover algún aspersor en los greens que muestran menor densidad en determinadas áreas debido a una falta de cobertura del sistema de riego. El riego con manguera en zonas puntuales ha de ser una herramienta a utilizar durante todo el verano.

Departamento Green Section
Real federación Española de Golf



¿Te gusta conducir?

