



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

CAMPO DE GOLF PARADOR EL SALER

Marzo, Preparación Open de España 2013


Presentes: D. Francisco Contreras, Director Parador El Saler
D. Mario Ballester Aliaga , Greenkeeper
D. Javier Jorge, Técnico Green Section

PS.4.2013

INFORME SEGUIMIENTO OPEN 2013 EL SALER

El motivo de este documento es informar del estado del campo en la actualidad y actualizar el programa de mantenimiento para el mes de marzo.

Las temperaturas registradas en la última semana del mes de febrero han sido más bajas de lo habitual lo que va a retrasar ligeramente el crecimiento de las variedades de clima cálido existentes en el campo. Grafica.



Aun así pensamos que para la fecha del torneo la planta de clima cálido estará activa proporcionando un color verdoso al rough y creando greens mas uniformes.

A continuación pasamos a comentar punto por puntolas zonas más importantes del campo.

❖ GREENES

Los greens mantienen una buena firmeza, y se encuentran libres de enfermedades a un mes y medio del torneo. Los signos de antracnosis encontrados en la anterior visita han desaparecido tras la fertilización.

Las bajas temperaturas registradas en las últimas fechas están favoreciendo el poco crecimiento de la planta y por lo tanto la no creación de colchón o thatch.

Los greens han sido pinchados con pincho macizo de 10 mm y recebados siguiendo el planning propuesto en el informe de marzo.



Debido a la poca actividad que muestra la planta por las bajas temperaturas se decidió eliminar la primera aplicación prevista para la última semana de febrero, y comenzar la segunda de marzo para realizar un total de tres aplicaciones antes del torneo.

Por último, destacar que los parches de grama que encontramos en los greens ya fueron resembrados con agrostis y ya se aprecia germinación. Esto asegurará buena cobertura durante el torneo en el caso de no encontrarse la grama totalmente activa.

Durante lo que resta de mes de marzo, las labores a realizarvan a ser las siguientes:

- Aplicación de humectante durante la **semana del 4 al 10 de marzo**.
- Aplicación de etephon + fertilizante durante la **semana del 11 al 17 de marzo**. 3l/ha de etephon + 25 l/ha de 25-0-0
- Aplicación preventiva de insecticida con imidacloprid a una dosis de 1'5 l/ha con riego posterior durante la **semana del 18 al 24 de marzo**
- Pinchado macizo + verticut + recebo **durante la semana del 25 al 31 de marzo**.
- Aplicación de etephon + regulador decrecimiento + fertilizante durante la **semana del 25 al 31 de marzo**. 3l/ha de etephon + 250 cc/ha de trinexapacethyl + 25 l/ha de 25-0-0

❖ ALREDEDORES DE GREEN

Los alrededores de green fueron pinchados y resembrados la última semana de febrero por lo que durante nuestra visita no se apreciaba germinación aun. El procedimiento fue el siguiente:

1. Pinchado macizo.
2. Siembra.
3. Recebo.

Previamente a esta siembra se realizó un tratamiento contra la hoja ancha que ya es apreciable como muestra la siguiente fotografía.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Es recomendable realizar lo antes posible una resiembra manual a las zonas que estaban cubiertas con mala hierba de hoja ya que al desaparecer quedará un hueco.

En lo que se refiere al corte, ya se ha realizado las ampliaciones de corte solicitadas en la anterior visita.

Las labores que se van a realizar en los alrededores de Green en lo que resta del mes de marzo van a ser las siguientes:

- Fertilización con 20-10-10 a una dosis de 20 gr/m² durante la **semana del 11 al 17 de marzo**.

❖ ANTEGREENES O COLLARES

Los collares poseen buena densidad aunque aún no es suficiente en algunas zonas por lo que se ha decidido aumentar la fertilización en estas zonas. Esta fertilización se ha realizado durante la semana del 4 al 10 de marzo aprovechando la fertilización de los greens.

Recordamos realizar estas fertilizaciones utilizando siempre fertilizantes micro granulados, en caso contrario podrían quedar marcados los greens con el fertilizante que pueda caer accidentalmente.

❖ TEES

Los tees se encuentran en buen estado. La siembra realizada en el mes de febrero ha creado una perfecta cobertura. Una aplicación de herbicida contra la hoja ancha será aplicada en las plataformas y en los alrededores de los tees durante la segunda semana del mes de marzo.

Durante este mes de marzo se realizará un pinchado macizo, aplicando semilla y recebo a continuación.

En lo que se refiere a las podas solicitadas, tanto los arbustos del hoyo 3 como los del 11 han sido cortadas. Quedaría pendiente la rama del tee 1, para la cual sería necesario alquilar una plataforma.

Las labores a realizar en los tees durante el mes de marzo son las siguientes:

- Cortar rama tee 1.
- Aplicación de herbicida. Dicamba+ 2,4D + MCPA a una dosis de 1'5 l/hadurante la semana del 11 al 17 de marzo.
- Fertilización con 20-10-10 a una dosis de 20 gr/m2 + pinchado macizo + resiembra + recebo **durante la semana del 18 al 24 de marzo.**

❖ CALLES

Las calles fueron pinchadas con pinchos macizo y fertilizadas siguiendo el planning establecido. El efecto del fertilizante y el trabajo realizado es evidente en la actualidad. Las calles presentan en la actualidad muy buena densidad y el color verde oscuro característico del Raygrass.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las calles están cortándose a 15 mm. Habrá que reducir la altura progresivamente hasta conseguir alturas entre 10/11 mm. La bajada de corte debe ser progresiva realizando una primera bajada a 13 mm la última semana de marzo y una segunda bajada a 10/11 mm la semana previa al torneo.

En lo que se refiere a tratamientos se realizará una aplicación preventiva de insecticida.

Por último, las calles serán fertilizadas tres semanas antes del torneo. Esto nos asegurará que las calles no sufran tanto la excesiva frecuencia de corte y bajada de altura.

Las labores que se van a realizar en las calles durante el marzo son las siguientes:

- Fertilización con ENTEC 20-10-10 a una dosis de 20 gr/m² durante la **semana del 25 al 31 de marzo.**
- Tratamiento insecticida 1'5 l/ha de imidacloprid + 2 l/ha de clorpirifos durante la **semana del 25 al 31 de marzo. Riego posterior.**
- Bajada de corte a 13 mm.

❖ ROUGH

Debido a las lluvias y fuertes vientos sufridos en las últimas semanas sigue pendiente el tratamiento contra la hoja ancha en el rough. La previsión es de realizarlo en la próxima semana.

En lo que se refiere a altura de corte, se mantendrá a una altura de 60 mm.y el semirough a 25 mm.y se realizaran aplicaciones localizadas de herbicida selectivo para eliminar la hoja ancha.

El rough deberá ser cortado la semana anterior al torneo y en el caso de no tener un color homogéneo se realizaría una fertilización foliar con sulfato amónico y hierro para igualar el color.

Por lo tanto las labores a realizar en el rough son las siguientes:

- Tratamiento hoja ancha con bambel triple durante la semana del 11 al 17 de marzo.

❖ BUNKERS

Los bunkers es la zona del campo que más problemas está ocasionando debido a los taludes de arena.

Las fuertes lluvias producidas recientemente han provocado grandes escorrentías que han tenido que ser reparadas. Esto ha ocasionado que los taludes vuelvan a estar sueltos.



En el caso de no haber más lluvias, es recomendable que de cara al torneo se rastrillen los taludes lo menos posible con el objetivo de alterar la superficie lo menos posible.

Por otro lado, ya se están eliminando las zonas de bunkers que se utilizaban como entrada para la máquina de bunkers y definiendo los bunkers. Estas zonas se están repoblando con especies autóctonas los bunkers deben ser perfectamente perfilados y definidos.



Por último, agradecer la hospitalidad recibida durante las visitas realizadas al Campo de Golf El Saler.

Reciban un cordial saludo.

*Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf*

RESUMEN LABORES

SEMANA	GREENES	ALREDEDORES DE GREENES	TEES/ANTEGREENES	CALLES	ROUGH
SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO	➤ Fertilización granular con 18-6-18 a 20 gr/m² + pinchado macizo + Recebo ➤				
SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO	➤ Tratamiento.3l/ha de etephon + 25 l/ha de 25-0-0 ➤ Verticut + Recebo ➤ Aplicación de humectante	➤ Fertilización granular 20- 10-10 a 25 gr/m² con abonadora manual. ADC- 16 mm			
SEMANA DEL 18 al 24 DE MARZO	➤ Insecticida con imidacloprid a una dosis de 1'5 l/ha con riego posterior ➤ Verticut + Recebo		➤ Fertilización con 20-10-10 a una dosis de 20 gr/m² + pinchado macizo + resiembra + recebo		
SEMANA DEL 25AL 31 DE MARZO	➤ Tratamiento.3l/ha de etephon + 250 cc/ha de trinexapacethyl + 25 l/ha de 25-0-0 ➤ Verticut + Recebo+ Pinchado	ADC- 14 mm		➤ Fertilización ENTEC 20-10-10 a una dosis de 20 gr/m² ➤ Tratamiento insecticida 1'5 l/ha de imidacloprid + 2 l/ha de clorpirifos. Riego posterior.	ADC- 13 mm

