



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

TALAYUELA GOLF

Septiembre 2014

Presentes: D. Miguel Ángel Guerra Mateos Técnico Green Section
D. Javier Plaza Timón, Encargado Talayuela Golf

TAL.09.2014

INFORME TALAYUELA GOLF SEPTIMBRE 2014

Como cada año desde la inauguración del campo en el año 2005 el campo no dispone de las necesidades mínimas de agua para la subsistencia de las variedades implantadas en el campo, debiendo adaptar diariamente los tiempos de riego al agua disponible, siendo estos muy inferior a las necesidades mínimas del campo. Como consecuencia cualquier variedad *Cool Season* existente en el campo muere quedando variedades resistente a la falta de agua, variedades como la *Gramma común* o *Digitaria*. Aun así la falta de densidad en el campo es evidente presentando zonas de juego con falta total de densidad.



Estado de los lagos de almacenamiento de agua

Ha continuación se expone el estado y las labores de las diferentes zonas del campo:

1 GREENES

Los greens se encuentran en buen estado, con buena densidad y un estado sanitario correcto. La rodadura es uniforme aunque se aprecia un nivel de thatch o colchón elevado.



Durante el mes de agosto se han llevado a cabo diferentes tratamientos para *Antracnosis* en *Poa Annua* y *Rhizostonia solani* enfermedades en continuo control. Estos tratamientos han consistido en materias activas nuevas ya que la continua utilización de las mismas materias activas produce resistencia de las diferentes enfermedades.

Estas materias activas han consistido en *Tebuconazol* + *Clortalonil* obteniendo unos excelentes resultados en el control de *Antracnosis* en *Poa Annua* y *Rhizostonia solani*.

Durante el mes de Septiembre continuaremos con las aplicaciones de estos fitosanitarios que tan excelentes resultados han generado.

El próximo 2 y 3 de septiembre se llevara a cabo el pinchado hueco de otoño. Tanto la variedad predominante en greens (*Poa Annua*) como las condiciones climatológicas no son las idóneas para el pinchado en esta época del año pero el calendario de torneo no hace posible otra fecha quedando disponible únicamente estos días.

De modo que las labores en esta zona del campo para el mes de julio serán las siguientes:

- **Semana del 1 al 7 de septiembre, Pinchado hueco.** El protocolo del pinchado para este día será el siguiente:
 1. Pinchado mediante vertidrain a profundidad de 250 mm con púa hueca 19*12*250
 2. Recogida de canutos, soplado y aplicación de abono 18-22-5 a dosis de 20 gr. /m².
 3. Aplicación de arena 0308 hasta cubrir orificios.
 4. Paso de rastra metálica
 5. Agua posterior
 6. Rulado diario (si existe la posibilidad)
 7. En los siguientes días realizaremos pases de cepillos de tripletas cruzados diariamente.
- **Semana del 22 al 28 de septiembre,** tratamiento fúngico mediante *Tebuconazol* 1 L/ha + *Clortalonil* 3 L/ha

2. ANTEGREENES

Los antegreenes se encuentran en buenas condiciones, aunque determinados antegreenes presentan síntomas de pérdida de densidad generada por *Antracnosis*. A lo largo del verano la persistencia de esta enfermedad ha sido continua y aunque no ha sido posible su erradicación, si ha existido un control, garantizando un mínimo de densidad en esta zona del campo.



Antegreenes con síntomas de Antracnosis

Una vez finalizado el pinchado de greens realizaremos un pinchado de antegreenes siguiendo el mismo protocolo de actuación que en el pinchado de greens pero limitando la profundidad por la dureza de terrero a 150 mm de profundidad.

De modo que las labores en esta zona del campo para el mes de julio serán las siguientes:

- **Semana del 1 al 7 de septiembre, Pinchado hueco.** . El protocolo del pinchado para este día será similar al de greens. La profundidad para esta zona será menor debido al tipo de suelo, siendo la profundidad de 150 mm.
- **Semana del 22 al 28 de septiembre,** tratamiento fúngico mediante *Tebuconazol* 1 L/ha + *Clortalonil* 3 L/ha

3. TEES

Los tees se encuentran con buena densidad y uniformidad aunque su mayor composición consiste en *grama común* y malas hierbas como la *Digitaria*. La necesidad de reducir los tiempos de riego debido a la falta de agua, ha generado que cualquier variedad de Cool Season haya prácticamente desaparecido. La sectorización de los aspersores de riego ha

garantizado gran parte de las plataformas del tees sacrificando en muchas zonas las faldas de esta zona de campo.



Sectorización de aspersores en tees

Durante el mes de septiembre se intentara mantener una frecuencia de corte de 2/3 veces semanales.

4. CALLES

Esta zona del campo es las más damnificadas por la falta de agua. Como se explica en el inicio de este informe, cualquier tipo de *Cool season* ha desaparecido por completo. Las variedades predominantes son tipo *Warm season* como gramas autóctonas y malas hierbas como Digitaria y Portulaca.



Estado general de las calles

Durante los próximos meses se espera la entrada en latencia de las variedades warm season y la desaparición de las malas hierbas como la *Digitaria*. Con la llegada de las lluvias de otoño se espera como cada año la germinación de variedades autóctonas de clima frío como la *Poa Annuua*, variedades que tienen un alto porcentaje de germinación y que año tras año realiza una resiembra natural en el campo. Esta germinación depende en gran medida de diferentes factores climáticos como los días de lluvias y las temperaturas. La realización de recebos genera un mayor índice de germinación por lo que durante el mes de septiembre se valorará la realización de recebos de arena mediante Dakota arrastra.

Durante el mes de septiembre se intentara mantener una frecuencia de corte de 2/3 veces semanales.

6. BUNKER

Los bunker se encuentran en unas condiciones óptimas para el juego. A pesar de los últimos tratamientos de *Glifosato* y *Pendimentalina* la germinación de malas hierbas ha sido evidente.



Durante el mes de septiembre se realizaran un tratamiento mediante glifosato para el control de malas hierbas.

En la medida de lo posible se continuara con la remodelación de bunker comenzando con el bunker de la calle 17, bunker que se realizaron las labores de drenaje en el verano del 2013 y que quedo pendiente de la incorporación de arena.

7. Riego

Debido al nivel bajo de agua y a la proliferación de algas, la limpieza de los filtros debe ser continua, dando mayor importancia a los tees al ser filtros de menor tamaño realizando limpiezas y chequeos constantes.

Al igual que el filtro de aspiración de las bombas la limpieza debe ser continua siendo esta tarea prioritaria para un buen funcionamiento del sistema de riego. **Durante el mes de septiembre todos los trabajadores del campo realizarán labores de limpieza hasta la hora del descanso de media mañana para garantizar el riego del campo.**



Saturación de algas en los filtros

Compromisos del ayuntamiento

- **Arena de recebo.** Tras la última reunión con el ayuntamiento se comprometen al suministro de arena para el recebo del próximo otoño.
- **Personal de apoyo.** Actualmente no existe personal cedida por el ayuntamiento.
- **Lago del 18.** El 30 de junio se realizó una reunión para la valoración de la reconstrucción del lago del 18 construido con anterioridad por parte del ayuntamiento y que hubo que demoler por su deficiente construcción. A la reunión asistieron por parte del ayuntamiento D. Marín Moreno, director de Infraestructura de la RFEG, D. Julián Zulueta, director de Talayuela Golf, D. Jesus Barrera y técnico del Departamento de la Green Section D. Miguel Guerra para la valoración de la obra. Tras ver los trabajos previsto a realizar por parte de director de infractucturas y al verificar que no existe proyecto de obra ni plastificado del mismo, la RFEG no se responsabiliza de dicha obra. **A fecha de este informe las obras aún no han comenzado.**



ZONA	ALTURA
CALLES	15 MM
TEES/ANTEGREENES	15MM
GREENES	3,7MM JACOBSEN/3,4 MM TORO
ROUGH	51 MM

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEES	CALLES
1 al 7 de septiembre	Pinchado hueco +abonado 18-22-5+ recebo	Pinchado hueco +abonado 18-22-5+ recebo	-	-
8 al 14 de septiembre	cepillado		-	-
15 al 21 de septiembre	cepillado Tratamiento fúngico Tebuconazol 1L/ha + Croltalonil 3 L/ha	Tratamiento fúngico Tebuconazol 1L/ha + Croltalonil 3 L/ha	-	-
22 al 28 de septiembre			-	-

Departamento Green Section

Real Federación Española de Golf



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF

