



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION

Mayo, 2014

Presentes:

D. David Gomez, Director Green Section Rfegolf
D. Javier Jorge, Técnico Green Section.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Tras la visita técnica realizada a El Real club de golf de Sevilla y al Real club Pineda acompañado del director de la Green Section David Gómez extraemos las siguientes conclusiones que pueden ser de interés tanto para Málaga golf como para El Saler.

1. Manejo del kikuyo:

El kikuyo es una especie invasora de clima cálido que se encuentra presente en algunos campos de golf.

Aunque es una especie de clima cálido, esta no entra completamente en letargo invernal a no ser que las temperaturas sean extremadamente bajas, algo que no suele ocurrir en los campos de la costa.

El kikuyo forma una superficie de juego densa y basta que en ocasiones puede llegar a ocasionar problemas al jugador ya que es muy costoso pasar el palo a través de esta.

Combatir esta “mala hierba” con químicos no es posible ya que no existe producto químico selectivo que elimine esta planta sin eliminar el resto de las especies que se encuentren presentes.

El problema que encontramos en un campo contaminado con kikuyo es la falta de uniformidad. Lo ideal es tener una única especie para conseguir que la superficie de juego sea homogénea, teniendo en cuenta que el kikuyo es una especie invasora y que va avanzando con el paso del tiempo, hemos planteado en algún momento fomentar este avance y conseguir que en algún momento todo el campo sea kikuyo y de este modo obtener una uniformidad. No olvidemos que el kikuyo avanza y no podemos hacer nada para evitarlo.

Tras conocer otros casos similares en diferentes campos, hemos llegado a la conclusión de que el método basado en fomentar la invasión del kikuyo es demasiado lento para aceptarlo como una posible solución a la falta de uniformidad.

Por lo tanto, si se desea que el campo sea uniforme en cuanto a la superficie de juego se refiere, sería necesario realizar un plan de renovación. Eliminando toda especie existente y sembrándolo de nuevo. De esta manera el campo sería uniforme tanto en verano (con la especie que se elija) como en invierno (resembrándolo con Ray-grass)



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



El coste económico de esta actuación sería muy elevado y por supuesto sería necesario cerrar 9 hoyos durante al menos 3 meses y a continuación los otros 9

Si analizamos la demanda de juego en las diferentes estaciones del año llegamos a la conclusión de que el verano (momento en el cual el kikuyo puede ocasionar problemas de falta de uniformidad) es un momento de baja demanda de juego. Una vez pasado el verano el campo se resiembraba con raygrass que permanece hasta junio/julio proporcionando una perfecta superficie de juego.

Por lo explicado anteriormente no recomendamos realizar ningún tipo de actuación, ya que la primera opción mencionada de fomentar el kikuyo es muy lenta y la segunda opción de eliminar lo existente y resembrar muy costosa y supondría muchos inconvenientes a socios y jugadores.

2. Intrusión de *Poa Annua* en greenes nuevos:

La *Poa Annua* es una especie de clima frío que encontramos en los campos de golf. Esta especie genera una gran cantidad de semilla durante prácticamente 9 meses al año, lo que provoca que se propague con gran facilidad.

En la actualidad no existen productos químicos registrados en España que eliminen la *Poa Annua* si eliminar el resto de especies que existen en el green.

Durante nuestra visita a algunos campos de Andalucía pudimos apreciar como la *Poa Annua* se encuentra incluso en greenes que apenas tienen un año de antigüedad. Otro ejemplo claro lo tenemos en el putting green de la parte trasera del campo de prácticas de El Saler. Este putting green fue renovado por completo matando la hierba existente y sembrándolo con *agrostis estolonifera*. En apenas 6 meses podemos afirmar que tiene un 60% de la superficie invadida por la *Poa Annua*.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las conclusiones que extraemos de todo esto son las siguientes:

1. Sin la posibilidad de realizar tratamientos químicos que sean selectivos no es posible mantener la *Poa annua* fuera de los greens por un largo periodo de tiempo.
2. La única solución es retirar la *Poa Annua* de forma manual lo cual daña enormemente la superficie y empeora la estética del green aparte de suponer un gran despliegue de medios.
3. En el campo de golf El Saler la presión de la *Poa annua* es enorme ya que la encontramos con gran densidad en prácticamente todo el campo.
4. Cualquier trabajo que se realice en El Saler debe ser tepeado en lugar de sembrado.

Por lo anteriormente explicado, no podemos asegurar que tras la realización del putting-green, este se mantenga libre de *Poa Annua* por un largo periodo de tiempo.

Reciban un cordial saludo.

*Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf*



¿Te gusta conducir?

